

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
예방접종 FAQ	4

번호	질문	조회수
7	Q 표준예방접종일정보다 접종이 지연된 경우 처음부터 재접종해야 하나요?	56
A	처음부터 접종하지 않고 지연된 접종차수부터 빠른 시일 내에 접종합니다. 여러 번 접종해야 하는 동일 백신의 경우에는 표준접종 간격보다 길어져도 면역효과에는 영향을 미치지 않습니다. 하지만, 표준접종간격보다 길어지면 감염병에 노출될 위험이 있으므로 지연된 예방접종은 가급적 빠른 시일 내에 접종받도록 합니다.	
6	Q 아이가 미숙아로 태어났습니다. 예방접종을 어떻게 해야 하나요?	44
A	태어난 생년월일을 기준으로 예방접종을 시행합니다. 예방접종은 미숙아로 태어났더라도 정상적인 발육 상태를 보이는 등 건강상 문제가 없을 경우 일반적인 원칙에 따라 접종을 하도록 합니다. 다만, 미숙아의 경우 재태기간, 출생체중, 동반 및 기저질환 등의 의학적 사항을 고려하여 접종 일정을 조정할 수 있으니 이용하는 접종 기관의 담당의사와 상담 후 접종 시기 등을 정하기 바랍니다.	
5	Q 임신부와 수유부도 예방접종할 수 있나요?	35
A	약독화 생백신은 태아에게 백신 바이러스가 전달될 수 있는 이론적 위험성 때문에 임신부에게 접종 금기이지만 불활성화 백신은 필요에 따라 접종 가능합니다. 수유부의 경우 일반적으로 약독화 생백신과 불활성화 백신 모두 접종이 가능합니다.(장티푸스, 황열, 두창 백신 제외)	
4	Q 보건소 백신과 병의원 백신에 차이가 있나요?	58
A	보건소와 병원에서 사용하는 백신은 차이가 없습니다.	
3	Q 영유아 예방접종시 왜 허벅지에 접종하나요?	48
A	엉덩이에 비해 허벅지에는 신경이나 혈관분포가 낮아 더 안전하므로 대퇴부 전외측에 접종하는 것을 권장합니다.	
2	Q 예방접종 간격을 어떻게 두어야 하나요?	54
A	생백신과 생백신은 동시접종을 하지 못한 경우 최소 4주간의 간격을 두고 접종해야 하며, 생백신과 사백신은 특별히 지켜야 할 접종간격은 없습니다.	
1	Q 예방접종은 왜 오전에만 가능한가요?	87
A	오후 접종 시에는 야간에 이상반응(발열, 두드러기, 호흡곤란등) 발견 시 신속한 대처가 어려울 수 있기 때문에 오전 접종을 실시하여 만약에 생길지도 모르는 이상반응에 빠르고 적절하게 대응하기 위한 것입니다	

제목

검색

GANGJIN

Web Contents

