

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
예방접종 전후 주의사항	4
예방접종 전.후 주의 사항	4
예방접종 전 주의 사항	4
예방접종 후 주의 사항	4
격한 의미에서 예방접종을 할 수 없는 항구적인 금기사항	4
예방접종 후 이상반응 바로알기	4

예방접종 전·후 주의 사항

① 예방접종 전 주의 사항

- 어린이의 건강상태를 가장 잘 아는 보호자가 동행하도록 합니다.
- 집에서 기상 시 체온을 측정하여 열이 있는지 확인합니다.
- 모자보건수첩, 또는 예방접종 기록부를 지참합니다.
- 접종 전날 목욕을 시키고, 청결한 의복을 입히고 데리고 옵니다.
- 예방접종을 하지 않는 어린이를 함께 데리고 가지 않습니다.

② 예방접종 후 주의 사항

- 접종당일과 다음날은 과격한 운동을 하지 않도록 조심시켜야 합니다.
- 접종 당일은 목욕을 하지 않습니다.
- 아이는 반드시 바로 눕혀 재웁니다.
- 접종부위는 청결하게 하고 아기가 긁지 않도록 합니다.
- 접종 후 고열, 경련 등이 있을 때에는 의사의 진찰을 받도록 합니다.
- 접종 후 20~30분간 보건소에 머물러 아이의 상태를 관찰합니다.
- 귀가 후 적어도 3시간이상 주의 깊게 관찰합니다.
- 접종 후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며 고열, 경련이 있을 때에는 곧 의사진찰을 받도록 합니다.

격한 의미에서 예방접종을 할 수 없는 항구적인 금기사항

백신의 성분에 대한 알레르기가 있는 경우

백일해 백신접종 후 7일 이내에 원인을 알 수 없는 뇌증이 발생한 경우 또한, 항구적인 금기사항은 아니지만 피접종자의 상태에 따라서 백신을 접종할 수 없는 경우가 있는데, 백신의 종류(약 독화 생백신, 비활성화 백신)에 따라서 다음과 같은 경우가 된다. 즉, 임신, 면역결핍, 혈액제제를 투여한 경우에는 생백신 접종의 금기사항이 되지만 비활성화 백신은 접종이 가능하다

예방접종 후 이상반응 바로알기

1. 예방접종도우미 홈페이지(<http://nip.cdc.go.kr>) 접속하기
2. 안전한 예방접종
3. 이상반응바로알기/이상반응 신고제도 안내/예방접종 피해 국가보상제도

GANGJIN

Web Contents

