

2019.05.14



“중증열성혈소판감소증후군(SFTS)
올해 첫 환자 발생”

**야외활동 시,
진드기
조심하세요!**

진드기! 어디에 많이 있을까?



텃밭



농경지



공원



잡목지



초지



활엽수림

진드기는 풀이 있는 장소 뿐 아니라
야생동물이 서식하는 모든 환경에
널리 분포해 있습니다

털진드기



참진드기



진드기가 옮기는 주의해야 할 진드기 매개감염병

[쯤쯤가무시증]

털진드기 유충에 물려 발생
혈액과 림프액을 통해 전신적 혈관염이
발생하는 것을 특징으로 하는 급성 발열성 질환

털진드기



참진드기



진드기가 옮기는 주의해야 할 진드기 매개감염병

[중증열성혈소판감소증후군 (SFTS)]

고열, 소화기 증상 등을
나타내는 감염병으로
치사율이 높아 주의해야하는 감염병

*13~18년까지 치사율은 약 20%

붙진드기



참진드기



진드기가 옮기는 주의해야 할 진드기 매개감염병

[라임병]

미국에서 매년 2만 건 이상 발생하며,
과녁 모양의 반점을 나타내는 것이 특징
국내에는 발생이 매우 적지만
주의해야 할 진드기 매개감염병

붙진드기



참진드기




진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 최선의 예방법!

야외활동 후 2주 이내에
38-40도의 고열과
오심, 구토, 설사 등의
소화기 증상이 있을 경우
즉시 의료기관을 방문하여 진료

백신 및
치료제가
없어요



야외 활동 시에는 잊지 마세요!



긴 옷에 양말로 피부 노출을 줄이고
풀밭에 앉지 않고
진드기 기피제를 뿌리고
귀가 후에는 깨끗이 씻기!

야외 활동 시 긴 옷 입고, 기피제 뿌리고, 귀가 후에는 잘 씻기



**진드기 매개 감염병 예방을 위해
꼭 기억하세요!**